

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА ГЕРБИОН® ПЛЮЩ СИРОПИ

Препаратнинг савдо номи: Гербион® плющ сиропи

Таъсир этувчи модда (ХПН): Печак баргининг куруқ экстракти

Дори шакли: сироп

Таркиби:

фаол модда: печак баргининг куруқ экстракти. 1 мл сироп 7 мг печак баргининг куруқ экстракти (*Hedera helix L., folium*) (5–7,5:1) сақлайди;

Экстрагент: Этанол 30% (м/м);

ёрдамчи моддалар: суюқ сорбитол (кристаллизацияланмаган) (E420), глицерол (E422), натрий бензоати (E211), лимон кислотаси моногидрати (E330), хушбўйлаштирувчи бальзам (пропиленгликол, этанол, цитронелла мойи, цитрал, лимон мойи, кашнич мойи), тозаланган сув.

Таърифи: Ўзига хос хидга эга бўлган сарғиш-жигарранг сироп. Чўкмалар мавжуд бўлишига йўл қўйилади.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Шамоллаш ва йўтал симптомларини бартараф қилиш учун препаратлар. Балғам кўчирувчи препаратлар, йўталга қарши воситалар билан мажмуалардан ташқари.

АТХ коди: R05CA12.

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Препарат ўзи билан биологик фаол моддалар (тритерпен сапонинлар) мажмуасини сақловчи оддий печак баргининг куруқ экстрактини тақдим этади, шу муносабат билан фармакокинетик тадқиқотларнинг ўтказилишини имкони мавжуд эмас.

Фармакокинетикаси

Препарат ўзи билан биологик фаол моддалар (тритерпен сапонинлар) мажмуасини сақловчи оддий печак баргининг куруқ экстрактини тақдим этади, шу муносабат билан фармакокинетик тадқиқотларнинг ўтказилишини имкони мавжуд эмас.

Қўлланилиши

Гербион® плющ сиропи ўзи билан қуйидаги балғам кўчирувчи воситалар сифатида қўлланилувчи келиб чиқиши табиий бўлган дори препаратини тақдим этади:

- шилимшиқ секрецияси кучайишли йўтал ва қийинлаштирилган нафас олиш билан кузатиб борилувчи нафас олиш йўллариининг ўткир шамоллаш касалликларида;
- бронхларнинг сурункали шамоллаш касалликларини зўрайишини енгиллаштириш учун.

Қўллаш усули ва дозалари

Дозалаш тартиби

Катталар ва 12 ёшдан катта бўлган ўсмирлар учун оддий доза кунига 3 марта 5-7,5 мл сиропни ташкил қилади.

Болаларда қўлланилиши

4 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар учун оддий доза кунига 3 марта 5 мл сиропни ташкил қилади.

1 ёшдан 4 ёшгача болалар учун оддий доза кунига 3 марта 2,5 мл сиропни ташкил қилади.

1 ёшгача бўлган гўдаклар учун оддий доза кунига 2 марта 2,5 мл сиропни ташкил қилади.

Қўллаш усули

Ичга, овқат истеъмол қилишдан қатъи назар.

Сиропни эрталаб ва куннинг иккинчи ярми бошида қабул қилинг.

Препаратнинг дозаланиши дозаловчи пластик қошиқча ёрдамида амалга оширилади.

Гербион® плюшч сиропи препарати билан даволаш даврида сув ёки кофеин сақламайдиган бошқа илиқ ичимликларни кўп миқдорда истеъмол қилиш тавсия этилади.

Даволаш давомийлиги касаллик туси ва унинг оғирлигига боғлиқ бўлади ва одатда 7 кунни ташкил қилади. Препаратни касалликни клиник белгилари ғойиб бўлгандан кейин яна 2-3 кун қабул қилиш тавсия этилади.

Ножўя таъсирлари

Аллергик реакциялар (тери тошмаси, тери кичишиши, диспноэ, анафилактик реакциялар) эҳтимоли бор. Меъда-ичак йўли томонидан бузилишлар: кўнгил айнаши, қусиш, диарея (тез-тезлиги номаълум) ҳақида хабар берилган.

Оғир ножўя ҳолатлар юзага келиши ҳолатида препарат билан даволашни тўхтатиш керак.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препарат компонентларига юқори сезувчанлик, аралаш оиласига мансуб гиёҳларга нисбатан юқори сезувчанлик.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Гербион® плюшч сиропи препаратининг бошқа дори воситалари билан дориларнинг ўзаро таъсири ҳақида хабарлар йўқ.

Препаратни балғам ҳосил бўлишини камайтирувчи йўталга қарши препаратлар билан бир вақтда қўллаш ярамайди, чунки бу суюлтирилган балғамнинг кўчиб чиқишини қийинлаштиради.

Махсус кўрсатмалар

Гербион® плюшч сиропи препаратини йўриқномада тавсия этилган дозалардан юқори дозаларда қабул қилиш ярамайди.

Қийинлаштирилган нафас олиш, иситмали қалтираш, узоқ муддатли йўтал ёки қон аралашмалари билан кузатиб борилувчи нафас олиш аъзолари касалликларида дарҳол шифокорга мурожаат қилиш зарурдир.

Гастрити ёки меъда яраси бўлган пациентларда эҳтиёткорликка риоя қилиш тавсия этилади. 7 кун давомида Гербион® плюшч сиропи препарати билан даволаш фонида самаранинг мавжуд бўлмаслиги ёки ҳолатнинг ёмонлашишида шифокорга мурожаат қилиш зарурдир.

Болалар

Турғун ёки даврий йўтали бўлган 4 ёшгача бўлган болаларда даволашни ўтказгунга қадар ташхис қўйилган бўлиши керак.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши

Гербион® плюшч сиропи препаратини ҳомиладор аёлларда ва эмизикли оналарда печак баргларининг қуруқ экстракти қўлланилиши бўйича етарлича маълумотлар мавжуд бўлмаслиги муносабати билан ҳомиладорлик вақтида ва эмизиш даврида уни қўллаш тавсия этилмайди.

Автомобилни ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Гербион® плюшч сиропи препаратини транспорт воситаларини бошқариш ва механизмлар билан ишлаш қобилиятига таъсири кузатилмаган.

Дозани ошириб юборилиши

Препаратнинг тавсия этилган дозалардан юқори дозаларда қабул қилиниши (суткалик дозанинг икки мартадан ортиғига ошириш) кўнгил айнаши, қусиш, диарея ва тўлқинлашишни чақириши мумкин. Даволаш симптоматик ҳисобланади.

Чиқарилиш шакли

150 мл сиропдан суюқликни бўлувчи пластмасса тикин ва биринчи очишни назорат қилишли пластик қопқоқ билан ёпилган тўқ шишадан флаконда.

1 флакондан тиббиётда қўлланилишига доир йўриқнома билан биргаликда пластик ўлчов қошиқчаси билан картон пачкага жойлаштирилади.

Сақлаш шароити

25°Сдан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Сиропни флакон очилгандан кейин 3-ойлик муддатда қўллаш керак.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилиқ муддати

2 йил.

Яроқлилиқ муддати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситасини сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)ни қабул қиладиган ташкилотнинг номи ва манзили:

Ўзбекистон Республикасида «КРКА, д.д., Ново место» Ваколатхонаси

100015, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Афросиёб кўч., 14

Тел.: +99878 150 2828, +99878 150 2929, телефакс: +99878 150 1044